



MINISTERIO  
DEL INTERIOR

SECRETARIA GENERAL  
DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS



**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO  
AL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA**

(RESOLUCIÓN DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018,  
DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,  
BOE 1 DE FEBRERO DE 2019)

**PRIMER EJERCICIO**

1. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Española, señale la respuesta CORRECTA:
  - a) España se constituye en un estado social y democrático de derecho
  - b) La soberanía nacional reside en las Cortes Generales
  - c) La forma política es la Republica
  - d) Propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico el deporte y la educación física
  
2. Respecto a las funciones del gobierno, señale la respuesta CORRECTA:
  - a) Ejerce la función legislativa
  - b) Ejerce la función judicial
  - c) Ejerce la función ejecutiva
  - d) Ninguna de las anteriores
  
3. Respecto al control de los actos del gobierno, señale la respuesta CORRECTA:
  - a) Los actos del gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales
  - b) El Gobierno no está sujeto a la Constitución
  - c) La actuación del Gobierno no es impugnable ante el Tribunal Constitucional
  - d) Los actos del Gobierno no son impugnables
  
4. Señale el órgano legislativo de la UE (Unión Europea) elegido directamente por todos los votantes de la UE:
  - a) Banco Central Europeo
  - b) Tribunal de Justicia de la Unión Europea
  - c) Parlamento Europeo
  - d) Consejo Europeo
  
5. Los empleados públicos se clasifican en:
  - a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal y personal eventual
  - b) Funcionarios de carrera y personal laboral
  - c) Funcionarios interinos y personal eventual
  - d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual

6. Los Presupuestos Generales del Estado se aprueban por:
  - a) Ley ordinaria
  - b) Reglamento
  - c) Real Decreto
  - d) Ley orgánica
  
7. Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Publicas para la realización de trámites de un procedimiento administrativo los siguientes sujetos:
  - a) Las personas jurídicas
  - b) Los Notarios
  - c) Los Registradores
  - d) Todas son correctas
  
8. Respecto al Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, señale la respuesta CORRECTA:
  - a) Depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública
  - b) Depende del Ministerio de Defensa
  - c) Depende del Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación
  - d) Depende de las organizaciones sindicales
  
9. Señale cuál de las siguientes normas jurídicas NO tiene fuerza de Ley:
  - a) Real Decreto-Ley
  - b) Ley Orgánica
  - c) Real Decreto Legislativo
  - d) Reglamento
  
10. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos:
  - a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio
  - b) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
  - c) Los que sean constitutivos de infracción penal
  - d) Todos los anteriores

11. Según el artículo 2 del vigente Reglamento Penitenciario, dentro de los fines de la actividad penitenciaria está la asistencia social que será de aplicación a:
  - a) Internos, liberados y familiares.
  - b) Solamente a los internos.
  - c) A los internos y liberados.
  - d) A los liberados y familiares.
  
12. Las Reglas Mínimas para el tratamiento del delincuente del año 1955 fueron elaboradas por
  - a) Estados Unidos.
  - b) El Comité Europeo para los Problemas Criminales.
  - c) El Consejo de Europa.
  - d) La Organización de Naciones Unidas.
  
13. Indique cuál de los siguientes es un derecho de los internos, recogido en la normativa actual vigente:
  - a) Participar en las actividades del centro.
  - b) Acatar las normas de régimen interior.
  - c) Mantener una actitud de respeto y consideración hacia las autoridades.
  - d) Utilizar adecuadamente los medios materiales que se pongan a su disposición y las instalaciones del establecimiento.
  
14. Según recoge el actual Reglamento Penitenciario en el artículo 13:
  - a) El sistema penitenciario estará orientado por el principio celular, de manera que cada interno comparta una celda con más internos.
  - b) El sistema penitenciario estará orientado por el principio celular, de manera que cada interno disponga de una celda.
  - c) En los establecimientos ordinarios podrán existir dormitorios colectivos, previa selección adecuada de los internos que los ocupen.
  - d) Ninguna de las anteriores.

15. Según el artículo 35 del Reglamento Penitenciario, cuál de las siguientes expresiones es cierta:
- a) La salida de internos para consulta o ingreso, en centros hospitalarios no penitenciarios será acordada por el Director del Establecimiento Penitenciario.
  - b) La salida de internos para consulta o ingreso, en centros hospitalarios no penitenciarios será acordada por el Médico del Establecimiento Penitenciario
  - c) La salida de internos para consulta o ingreso, en centros hospitalarios no penitenciarios será acordada por el Centro Directivo.
  - d) La salida de internos para consulta o ingreso, en centros hospitalarios no penitenciarios será acordada por el Jurista del Establecimiento Penitenciario
16. Los visitantes que no sean familiares para poder tener comunicaciones orales con los internos deberán obtener autorización del
- a) Director del Establecimiento.
  - b) Subdirector de Seguridad.
  - c) No requiere autorización.
  - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
17. A los efectos del artículo 45.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, son medios coercitivos:
- a) El aislamiento provisional.
  - b) La privación de paseos
  - c) La limitación de las comunicaciones
  - d) Ninguna de las anteriores.
18. Señalar la opción CORRECTA respecto a quienes se aplica el régimen cerrado.
- a) A los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación al régimen ordinario y abierto.
  - b) A los preventivos en los que concurren las circunstancias citada en la opción primera.
  - c) A los penados sin clasificar.
  - d) A los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación al régimen ordinario y abierto y a los preventivos en quienes concurren idénticas circunstancias.

19. Para la individualización del tratamiento de los internos se realizará su clasificación, que determinará el destino al Establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado, conforme a este principio, señale cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA:
- a) Serán clasificados en segundo grado los preventivos en quienes concurren unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad.
  - b) La clasificación en tercer grado se aplicará a los detenidos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.
  - c) La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.
  - d) Ninguna de las anteriores.
20. Según el ordenamiento penitenciario, el límite de días por año para los permisos de salida ordinarios como preparación para la vida en libertad para los condenados clasificados en tercer grado es de
- a) 24 días por año.
  - b) 36 días por año.
  - c) 38 días por año.
  - d) 48 días por año.
21. Todos los penados tienen el deber de trabajar, EXCEPTO:
- a) Los mayores de cincuenta y cinco años de edad.
  - b) Los perceptores de prestaciones por jubilación.
  - c) Las mujeres.
  - d) Los menores de veinte años.
22. Según el artículo 184 del Reglamento Penitenciario, el ingreso en los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas penitenciarias se llevará a cabo en el siguiente caso:
- a) Los detenidos o presos con patología psiquiátrica, cuando el médico del establecimiento lo indique.
  - b) Personas a las que por aplicación de las circunstancias eximentes establecidas en el Código Penal les haya sido aplicada una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario.
  - c) Todos los penados con enfermedad mental.
  - d) Ninguno de los anteriores.

23. El reconocimiento médico al ingreso de un interno en un Establecimiento Penitenciario:
- Se llevará a cabo durante las primeras cuarenta y ocho horas a partir del ingreso.
  - Se llevará a cabo durante las primeras ocho horas a partir del ingreso.
  - Se llevará a cabo durante las primeras veinticuatro horas a partir del ingreso.
  - Se llevará a cabo durante las tres primeras horas a partir del ingreso.
24. Respecto del Régimen y Procedimiento disciplinario regulado en la normativa penitenciaria, en el cumplimiento de las sanciones de aislamiento, cuál de las siguientes aseveraciones es cierta:
- Las sanciones de aislamiento se cumplirán con informe previo y reconocimiento del Psicólogo del Establecimiento.
  - El médico vigilará diariamente al interno mientras permanezca en esa situación, informando al Director sobre su estado de salud física y mental y, en su caso, sobre la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta.
  - En los casos de enfermedad del sancionado no se aplazará la efectividad de la sanción de aislamiento.
  - Se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes.
25. En el actual reglamento Penitenciario, la Libertad condicional de septuagenarios y enfermos terminales, viene regulada en:
- El artículo 166 del Reglamento Penitenciario.
  - El artículo 169 del Reglamento Penitenciario.
  - El artículo 96 del Reglamento Penitenciario.
  - El artículo 196 del Reglamento Penitenciario.
26. Para poder proceder a la liberación de los condenados a penas privativas de libertad será necesaria:
- La aprobación de la libertad definitiva por el Juzgado de Guardia.
  - La aprobación de la libertad definitiva por el Tribunal Sentenciador.
  - La aprobación del expediente de libertad condicional por el Tribunal Sentenciador.
  - La aprobación de la libertad definitiva por el Centro Directivo.

27. Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días, corresponden al:
- Director del Establecimiento.
  - Centro Directivo.
  - Juez de Vigilancia Penitenciaria.
  - Equipo Técnico.
28. Según la regulación sobre Órganos Colegiados en un establecimiento penitenciario, la Junta de Tratamiento:
- Estará presidida por el Subdirector de Tratamiento del Centro penitenciario.
  - Estará presidida por el Subdirector de Seguridad del Centro penitenciario.
  - Estará presidida por un Jurista de reconocido prestigio del Centro penitenciario.
  - Estará presidida por el Director del Centro penitenciario.
29. En un Establecimiento penitenciario, el seguimiento y control del sistema contable, es una función de:
- La Junta de Tratamiento.
  - La Junta Económico-Administrativa.
  - La Junta de Régimen.
  - La Junta de Seguridad.
30. Según el artículo 308 del Reglamento Penitenciario, por resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios se fijarán anualmente los valores de las raciones alimenticias, distinguiendo, al menos, una de las siguientes categorías:
- Internos sanos.
  - Internos mayores de setenta años.
  - Internas embarazadas.
  - Internos celiacos.
31. ¿Qué es una tasa?
- El número de personas que padece una enfermedad
  - La razón de cambio entre dos magnitudes
  - El cociente de dos frecuencias absolutas en el que el numerador está incluido en el denominador en relación con el tiempo de exposición
  - El cociente de dos frecuencias absolutas en el que el numerador no está incluido en el denominador en relación con el tiempo de exposición

32. ¿Cuál de los siguientes es un fin de la epidemiología?
- a) Identificar nuevas enfermedades
  - e) Determinar el tratamiento más adecuado de una enfermedad
  - f) La intervención aleatorizada
  - g) Realizar ensayos descriptivos
33. ¿Qué se entiende por el término "Odds"?
- a) El tipo de razón en la que el numerados representa la probabilidad de que ocurra un suceso y el denominador la probabilidad de que no ocurra un suceso
  - b) La incidencia de una enfermedad que ha permanecido estable a lo largo el tiempo
  - c) La relación entre incidencia y prevalencia
  - d) La razón entre el número de casos nuevos de una enfermedad y la población promedio
34. ¿Cómo se define la tasa de mortalidad?
- a) El conjunto de fallecidos en una población durante un periodo de tiempo concreto
  - b) La razón entre el número de fallecimiento y nacimientos en un periodo determinado
  - c) La proporción de fallecidos por una causa concreta del total de fallecidos en un periodo de tiempo
  - d) Porcentaje de pacientes que mueren por una enfermedad determinada en relación con el conjunto total de fallecidos de la población
35. ¿Cuál de los siguientes procedimientos se utiliza en el ajuste de tasas de mortalidad?
- a) El método directo o de población tipo
  - b) El método inverso proporcional
  - c) El método de mortalidad evitable
  - d) El método directo de transferencia cruzada

36. ¿Se define morbilidad cómo?
- a) La tasa de enfermos en relación con los habitantes fallecidos
  - b) El estudio de las enfermedades que provocan la muerte
  - c) Los años que se dejan de vivir cuando se muere repentinamente
  - d) La reducción de la probabilidad de muerte
37. El intervalo de tiempo transcurrido entre el momento de la exposición y el inicio de la transmisibilidad es, defina a:
- a) El periodo de transmisibilidad
  - b) El periodo de incubación
  - c) El periodo de latencia
  - d) El tiempo de generación
38. ¿En la vacunación de la Hepatitis B en los internos en Instituciones Penitenciarias (pauta 3 dosis: 0,1, 6meses), está indicado?
- a) Realizar serología pre-vacunación y post-vacunación
  - b) Solo realizar serología post-vacunación
  - c) Realizar serología previa
  - d) La vacunación no está indicada
39. ¿Cuál de los siguientes es un método químico en el control de plagas?
- a) Control biológico
  - b) Aplicación de plaguicidas
  - c) Sustancias modificadoras del comportamiento
  - d) Hormonas de insectos
40. La gestión interna de los residuos biosanitarios comprende las siguientes actividades, EXCEPTO:
- a) Segregación
  - b) Envasado
  - c) Identificación
  - d) Gestión avanzada

41. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la primoinfección es la CORRECTA?
- La carga viral plasmática es muy baja
  - El VIH es 26 veces más infeccioso durante este periodo que durante el asintomático
  - El VIH es 7 veces más infeccioso durante los 10 meses previos al fallecimiento del paciente
  - La infectividad del VIH es nula durante los 19 meses previos al fallecimiento del paciente
42. Las únicas pautas dobles recomendadas para el tratamiento inicial de la infección por el VIH1 en la actualidad consisten en:
- La combinación de un inhibidor de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido o nucleótido (ITIAN) 3TC (Lamivudina) y un inhibidor de la integrasa (INI) DTG (Dolutagavir)
  - Dos 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido o nucleótido (ITIAN)+ 2 inhibidor de la proteasa potenciado (IP/p)
  - Combinación de un inhibidor transcriptasa inversa no nucleósido (ITINN) y un inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido o nucleótido (ITIAN)
  - 2 inhibidores de la proteasa uno potenciado (IP/p) y uno no potenciado
43. El tratamiento del VIH para régimen de inicio es :
- 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido o nucleótido (ITIAN) + 1 inhibidor transcriptasa inversa no nucleósido (ITINN)
  - 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido o nucleótido (ITIAN)+ 1 inhibidor de la proteasa potenciado (IP/p)
  - Dos FTC/TAF (Emtricitabina/Tenofovir alafenamida) o ABC/3TC (Abacavir/Lamivudina)
  - Ninguno de los anteriores
44. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma general o constitucional de la Tuberculosis?
- Tos persistente
  - Febrícula o fiebre de más de siete días, generalmente vespertina
  - Hemoptisis o expectoración hemoptoica
  - Dolor torácico generalmente de característica pleurítica

45. El régimen de tratamiento de la tuberculosis recomendado en Instituciones Penitenciarias es
- a) 2 Isoniacida+ Rifampirina+Pirazinamida+Etambutol o Estreptomycin / 4 Isoniacida +Rifampicina (2HRZE/4HR)
  - b) 2 Rifampicina + Pirazinamida + Etambutol o Estreptomycin/ Rifampicina + Pirazinamida (4RZE/2RZE)
  - c) 4 Isoniazida+Rifampicina /7 Isoniazida+Rifampicina+Pirazinamida (4HR/7HRZ)
  - d) 2 Rifampicina+Pirazinamida+ / 7 Rifampicina+Pirazinamida+ Etambutol o Estreptomycin (4RZ/7RZE)
46. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la Sífilis Primaria?
- a) Penicilina G benzatina 2.400.000 UI por vía IM a dosis única
  - b) Penicilina G benzatina 2.400.000 UI por vía IM/ semana, durante 3 semanas
  - c) Penicilina G sódica 3-4.000.000 UI por vía IV cada 4 horas durante 10-14 días
  - d) Penicilina G procaína 2.400.000 UI por vía IM al día + Probenecid (500 mg/6h) durante 10-14 días
47. Entre los procedimientos no invasivos para determinar el grado de fibrosis, en pacientes con Hepatitis C crónica, se encuentra:
- a) Endoscopia
  - b) Cateterismo venas suprahepáticas
  - c) Elastografía
  - d) Biopsia
48. Señale cuál de los siguientes signos físicos NO es característico en un caso típico de insuficiencia cardíaca congestiva:
- a) Reflujo hepatoyugular presente.
  - b) Edema bilateral en miembros inferiores
  - c) Acropaquias
  - d) Estertores crepitantes en la auscultación pulmonar.

49. Paciente de 56 años con fibrilación auricular tratada con digoxina. Dos horas antes presentó un cuadro de incapacidad para hablar y hemiplejía derecha. Se realiza TC urgente que no demuestra alteraciones relevantes ¿Cuál es la causa más probable de su cuadro?
- a) Tumor cerebral.
  - b) Hemorragia cerebral.
  - c) Infarto cerebral.
  - d) Esclerosis múltiple.
50. Una mujer de 49 años presenta febrícula, anorexia y pérdida de peso desde hace 2 meses. Se ha notado una pápula eritematosa y dolorosa en el pulpejo del dedo anular derecho. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?
- a) Fiebre tifoidea.
  - b) Endocarditis bacteriana subaguda.
  - c) Meningococcemia crónica.
  - d) Fiebre botonosa
51. El patrón dislipémico del síndrome metabólico se caracteriza por las siguientes alteraciones metabólicas, EXCEPTO:
- a) Hipertrigliceridemia.
  - b) Marcada elevación de la LDL-colesterol.
  - c) Descenso del HDL-colesterol.
  - d) Hiperglucemia.
52. ¿Cuál es la causa más frecuente de dolor epigástrico en la práctica diaria?
- a) La úlcera gástrica.
  - b) La úlcera duodenal.
  - c) La dispepsia no ulcerosa.
  - d) La esofagitis péptica.

53. Sobre las formas de presentación de la enfermedad de Crohn, señale la respuesta INCORRECTA:
- a) Puede presentarse como una oclusión intestinal secundaria a estenosis fibrosas.
  - b) La forma aguda, que simula una apendicitis, es la más frecuente.
  - c) Existe una forma febril que en general sugiere la existencia de una complicación séptica intraabdominal.
  - d) La forma tumoral se caracteriza por la palpación de una masa abdominal.
54. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es el que indica peor evolución en un paciente que acude con una crisis asmática?
- a) Silencio auscultatorio
  - b) Taquipnea
  - c) Espiración prolongada
  - d) Presencia de sibilancias a la auscultación
55. El hallazgo más frecuente en la radiografía de tórax en un paciente con asma en los periodos de intercrisis es:
- a) Hiperinsuflación pulmonar.
  - b) Condensaciones alveolares bilaterales y difusas
  - c) Radiografía de tórax normal
  - d) Engrosamiento de paredes bronquiales
56. En el diagnóstico diferencial entre asma y EPOC, señale la respuesta FALSA:
- a) En el asma el inicio puede ser a cualquier edad.
  - b) En la EPOC el consumo de tabaco no tiene influencia.
  - c) En el asma hay frecuentemente antecedentes familiares.
  - d) En la EPOC no suele haber rinitis, conjuntivitis y dermatitis acompañantes.
57. La clasificación de la severidad del asma se basa en:
- a) Anamnesis de síntomas y agudizaciones.
  - b) Medidas objetivas de obstrucción bronquial.
  - c) Impacto sobre actividad cotidiana.
  - d) Todas las anteriores son correctas.

58. Con relación al temblor esencial, señale la respuesta CORRECTA:
- a) Generalmente mejora con propranolol
  - b) Inicialmente se manifiesta en reposo
  - c) Puede mejorar con levodopa a dosis bajas
  - d) Es más grave en los casos de presentación familiar
59. Una de las siguientes actuaciones en una primera crisis epiléptica, en el momento de producirse, es INCORRECTA:
- a) Evitar que el paciente se lesione al caerse o durante las convulsiones.
  - b) Administrar Diazepan 10 mg iv.
  - c) Evitar aspiraciones: retirar prótesis dentales.
  - d) Evitar mordeduras de lengua.
60. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta con respecto a las cefaleas?
- a) La cefalea tensional tiene una localización hemicraneal.
  - b) La migraña en racimos suele tener una duración entre 3 y 72 horas.
  - c) La cefalea tensional puede durar días.
  - d) La migraña sin aura desaparece con la edad.
61. Con relación al vértigo, señale la respuesta INCORRECTA:
- a) El vértigo periférico cursa sin clínica neurológica asociada
  - b) En el vértigo de origen central el nistagmo provocado tiene periodo de latencia
  - c) El vértigo periférico es de comienzo brusco
  - d) En el vértigo de origen central el nistagmo espontáneo no se suprime con la fijación visual
62. ¿En cuál de los siguientes casos no sería conveniente realizar una infiltración del hombro?
- a) Tendinitis bicipital humeral
  - b) Tendinitis del tendón del manguito de los rotadores
  - c) Bursitis subadromial
  - d) Patología acromioclavicular

63. Paciente de 30 años que acude por ojo rojo. No ha mejorado e incluso ha empeorado después de 4 días de tratamiento con un colirio antibiótico. Ante este cuadro ¿Cuál de las siguientes es la respuesta CORRECTA?
- a) En un ojo rojo sin diagnóstico, prescribir en principio un tratamiento antibiótico puede desencadenar o agravar una conjuntivitis alérgica
  - b) En conjuntivitis que no mejoran debe mantenerse el tratamiento durante 15 días
  - c) La ausencia de lagrimeo indica que la superficie ocular está irritada y que la córnea puede estar afectada.
  - d) Las viriasis causan lagrimeo escaso
64. Ante una hemorragia digestiva, ¿cuál sería la prioridad en una actuación inicial?
- a) Hacer el diagnóstico etiológico
  - b) Instaurar un tratamiento específico.
  - c) Localizar el origen del sangrado.
  - d) Valoración y control del estado hemodinámico.
65. La muerte en la ahorcadura tiene lugar por:
- a) Mecanismo asfíctico.
  - b) Mecanismo circulatorio.
  - c) Mecanismo nervioso.
  - d) Por cualquiera de los anteriores mecanismos, aislados o conjuntamente.
66. Ante un paciente que presenta rinorrea purulenta, cefalea y dolor en región frontal ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:
- a) Rinitis alérgica vasomotora.
  - b) Cefalea en racimos
  - c) Sinusitis aguda bacteriana.
  - d) Otitis media aguda.
67. De estas acciones ¿cuál es la más prioritaria a realizar en una parada cardiorespiratoria?:
- a) Intubación orotraqueal.
  - b) Ventilar con oxígeno a alta concentración.
  - c) Realizar las compresiones torácicas.
  - d) Realizar ventilaciones

68. ¿Cuál considera la fisiopatología fundamental del shock hipovolémico? Señale la respuesta CORRECTA:
- Hipoperfusión tisular
  - Hipotensión arterial.
  - Liberación de sustancias vasoactivas.
  - Aumento del ácido nítrico.
69. ¿En cuál de las siguientes localizaciones anatómicas es más frecuente la pitiriasis versicolor?
- Codos y rodillas
  - Dorso de manos y pies
  - Pecho y espalda
  - Cara y cuello
70. En cuanto a los índices urinarios en el diagnóstico del fracaso renal agudo prerrenal, indique la afirmación INCORRECTA:
- El sodio urinario es inferior a 20mEq/l
  - El índice de fallo renal (IFR) es superior a 1
  - El cociente entre la urea urinaria y la urea plasmática es superior a 400 mOsm/Kg
  - La osmolaridad urinaria es superior a 400mOsm/Kg
71. En relación a la nefrolitiasis, señale la respuesta FALSA:
- La litiasis de ácido úrico responde bien a la alcalinización de la orina
  - La litotricia extracorpórea por ondas de choque es el método elegido para el tratamiento de la mayoría de los cálculos no expulsados, sobre todo en los casos de pionefrosis
  - La nefrolitiasis es la causa más frecuente de obstrucción urinaria en el varón
  - La eliminación de los cálculos menores de 5 mm es espontánea en la mayoría de los casos
72. La hipoacusia característica de la enfermedad de Menière es:
- Hipoacusia de transmisión
  - Hipoacusia neurosensorial fluctuante
  - Hipoacusia mixta de transmisión y neurosensorial
  - Hipoacusia neurosensorial retrolaberíntica

73. En una fractura de tercio medio de diáfisis de húmero, el nervio más vulnerable de lesionarse cuando existe un desplazamiento de los fragmentos es:
- a) Mediano
  - b) Cubital
  - c) Radial
  - d) Axial
74. En relación con la artrosis, ¿Qué afirmación es CORRECTA?
- a) La afectación sintomática de la cadera es mucho más frecuente que la afectación de la rodilla
  - b) La obesidad no se ha demostrado que sea un factor de riesgo para su desarrollo
  - c) La rigidez matutina habitualmente dura menos de 30 minutos
  - d) La presencia de una velocidad de sedimentación (VSG) elevada apoya fuertemente el diagnóstico
75. De entre las siguientes, señale la que puede ser causa de dolor abdominal:
- a) Pericarditis
  - b) Rotura de bazo
  - c) Tabes dorsal
  - d) Todas las respuestas son correctas
76. Respecto a la regla de los 9 de Wallace, señale la respuesta INCORRECTA:
- a) Es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada de un paciente
  - b) Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9
  - c) La cabeza del adulto corresponde a un 9% y la del niño un 13%
  - d) Las extremidades superiores corresponden a un 18% tanto en el adulto como en el niño

77. Paciente que acude porque ha recibido un fuerte impacto con una pelota de tenis a nivel de la órbita derecha. A la exploración presenta importante hematoma palpebral, hiposfagma y diplopía a la visión superior, con limitación de la versión superior del globo ocular ¿Qué sospecharía?
- a) Fractura en la pared inferior del suelo de la órbita con atrapamiento del músculo recto inferior
  - b) Fractura de la pared superior de la órbita
  - c) Fractura del arco cigomático
  - d) Fractura dentoalveolar
78. En las autolesiones en el medio penitenciario, señale la respuesta CORRECTA:
- a) El comportamiento autolesivo es multicausal
  - b) Los hombres privados de libertad se autolesionan en mayor número y frecuencia que las mujeres
  - c) Las heridas incisivas son las autolesiones más frecuentes en el medio penitenciario
  - d) Todas las respuestas anteriores son correctas
79. De las siguientes, señale cuál no es una causa de abdomen agudo quirúrgico
- a) Infarto mesentérico
  - b) Rotura de trompa en embarazo extrauterino
  - c) Absceso abdominal
  - d) Seudoobstrucción intestinal idiopática
80. De las siguientes afirmaciones sobre el eczema, señale la respuesta INCORRECTA:
- a) El eczema es una enfermedad inflamatoria de la piel caracterizada por grupos de lesiones papulares con grado variable de exudación y escama
  - b) Algunas veces el rasgo principal es la formación de ampollas
  - c) El eczema atópico afecta principalmente a las superficies flexoras de los codos y las rodillas, rostro y cuello
  - d) Las formas crónicas de eczema atópico son la pitiriasis alba y la dermatitis plantar juvenil crónica

81. Ante la sospecha clínica de déficit de hierro, ¿qué datos analíticos, además del hemograma, debe valorar para establecer el diagnóstico de certeza?
- Sideremia, ácido fólico y vitamina B12.
  - Sideremia, índice de saturación de la transferrina y ferritina sérica.
  - La ferritina sola es suficiente.
  - Si la sideremia está claramente baja, no hacen falta otros datos.
82. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la Tripanosomiasis Americana o enfermedad de Chagas, señale la correcta:
- Las más frecuentes son las cutáneas.
  - Puede afectar al corazón, esófago e intestinos.
  - Produce clínica en todos los infectados.
  - La mayoría fallece por problemas digestivos.
83. En un paciente de 35 años con un síndrome depresivo en tratamiento con inhibidores de la recaptación de serotonina está contraindicado el uso de uno de los siguientes antimicrobianos:
- Linezolid.
  - Doxiciclina.
  - Amoxicilina-clavulánico.
  - Vancomicina.
84. Ante un paciente que está en plena crisis de angustia, una de las siguientes medidas es INEFICAZ:
- Buspirona.
  - Lorazepam sublingual.
  - Control de la respiración.
  - Explicación de la benignidad del cuadro.
85. Uno de los siguientes síntomas NO forma parte de los criterios diagnósticos del trastorno por estrés postraumático:
- Pesadillas recurrentes con el suceso traumático.
  - Amnesia de detalles importantes del acontecimiento.
  - Estado de ánimo depresivo.
  - Evitación de los lugares relacionados con el suceso.

86. En un paciente con hepatopatía preferiremos utilizar una de las siguientes benzodiacepinas:
- a) Diazepam.
  - b) Cloracepato dipotásico.
  - c) Alprazolam.
  - d) Lorazepam.
87. Dé su juicio diagnóstico en el caso de una mujer de mediana edad y sin antecedentes psiquiátricos de interés, que presenta profunda tristeza y llanto, estando convencida de padecer una enfermedad mortal en castigo por los pecados que ha cometido. Ha dejado de tomar alimento alguno, está postrada en la cama y a duras penas responde a las preguntas que se le hacen:
- a) Trastorno distímico.
  - b) Depresión farmacógena.
  - c) Depresión psicótica.
  - d) Esquizofrenia catatónica.
88. Las listas de fármacos capaces de causar depresión son muy largas; sin embargo, uno de los siguientes NO se asocia con depresión sino con manía:
- a) Propranolol.
  - b) Isoniacida.
  - c) Neurolépticos.
  - d) Anticonceptivos hormonales.
89. En una de las siguientes indicaciones NO se utilizan antidepresivos:
- a) Trastorno por angustia.
  - b) Dolor crónico neuropático.
  - c) Cefalea tensional.
  - d) Abstinencia alcohólica.
90. Una vez superada la fase aguda de una depresión, se recomienda:
- a) Retirar el tratamiento antidepresivo.
  - b) Reducir la dosis a la mitad y mantener el tratamiento 6 semanas más.
  - c) Mantener al menos 6 meses la misma dosis que produjo la mejoría.
  - d) Dejar una dosis mínima y eficaz para prevenir recaídas de forma indefinida.

91. El concepto actual de esquizofrenia se apoya en los siguientes datos SALVO:
- a) Curso habitualmente crónico y deteriorante.
  - b) Presencia de crisis alucinatorias y delirantes.
  - c) Duración superior a 6 meses.
  - d) Ausencia de factores psicosociales precipitantes.
92. ¿Cuál de los síntomas siguientes aparece con mayor claridad en la fase residual de la esquizofrenia?
- a) Percepciones delirantes.
  - b) Aplanamiento afectivo.
  - c) Pseudoalucinaciones auditivas.
  - d) Conducta catatónica.
93. La probabilidad de recaída en un paciente esquizofrénico NO está en relación con:
- a) Su conciencia de enfermedad.
  - b) Los efectos secundarios del tratamiento.
  - c) El tipo de esquizofrenia.
  - d) El cumplimiento de la medicación.
94. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de los antipsicóticos “típicos”?
- a) Bloqueo serotoninérgico 5HT<sub>1a</sub>.
  - b) Estímulo GABAérgico.
  - c) Antidopaminérgico D<sub>2</sub>.
  - d) Anticolinérgico muscarínico.
95. Una de las siguientes afirmaciones sobre los antipsicóticos “típicos” es FALSA:
- a) Los antipsicóticos “típicos” son todos igual de eficaces.
  - b) La potencia de un antipsicótico se refiere a su acción antidopaminérgica.
  - c) Cuanto más potente es un antipsicótico más hipotensión produce.
  - d) Los efectos extrapiramidales de los antipsicóticos de baja potencia son escasos.

96. ¿Cuál de los siguiente fármacos cree que tiene más posibilidades de inducir un parkinsonismo yatrogénico?
- Omeprazol.
  - Risperidona.
  - Clozapina.
  - Quetiapina.
97. Dentro de las opciones de abordaje de tipo psicosocial de la esquizofrenia, se considera DESCARTADO en el momento actual:
- Terapia de modificación de conducta.
  - Grupos de autoayuda de familias.
  - Psicoterapias dinámicas.
  - Centros de rehabilitación psicosocial.
98. De las relaciones siguientes entre fármacos y su uso en la dependencia de opiáceos, una es FALSA:
- Naloxona – tratamiento de la intoxicación (sobredosis).
  - Metadona – tratamiento de mantenimiento con opiáceos.
  - Naltrexona–tratamientodedeshabitaciónconantagonistas.
  - Clonidina – tratamiento de deshabitación sin opiáceos.
99. Una chica de 18 años es llevada al Servicio de Urgencias por sus padres porque la han encontrado en su habitación realizándose cortes en los antebrazos. La paciente dice hacerse los cortes “para sentir que existo” y expresa sentimientos crónicos de vacío. Es conocida en el Servicio de Urgencias por los numerosos intentos autolíticos que ha realizado mediante la ingestión de pastillas. Refiere tener atracones ocasionalmente y sus padres están asustados por su promiscuidad sexual. Durante la entrevista, dice en ocasiones que se quiere ir de vacaciones, para poco después ponerse a llorar y expresar deseos de suicidio. ¿Cuál es el trastorno de personalidad que padece?
- Personalidad antisocial.
  - Personalidad pasivo-agresiva.
  - Personalidad límite.
  - Personalidad depresiva.

100. Una persona que lleva una vida bastante marginal, con un repertorio limitado de intereses, una llamativa ausencia de relaciones sociales y con una respuesta emocional escasa, presenta una personalidad:
- a) Esquizoide.
  - b) Esquizoafectiva.
  - c) Esquizofrénica.
  - d) Esquizotípica.

### **RESERVA**

101. Cuando prescriben las faltas disciplinarias muy graves conforme establece el artículo 258 del Reglamento Penitenciario.
- a) A los seis meses.
  - b) Al año.
  - c) A los dos años.
  - d) A los tres años.
102. Señalar en qué trastorno de la personalidad se observa la ausencia de remordimientos y la incapacidad de planificar el futuro:
- a) Paranoide.
  - b) Límite.
  - c) Antisocial.
  - d) Esquizoide.
103. En el modelo de consejo educativo en atención primaria, se tendrá presente:
- a) Investigar los hábitos insanos
  - b) Establecer una alianza educativa con el paciente
  - c) Seleccionar la conducta de salud que se va a modificar
  - d) Todas son partes del consejo



**Anexo - I**

Plantilla de corrección correspondiente al PRIMER EJERCICIO realizado el 9 de abril de 2019, de las pruebas selectivas para el ingreso al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, BOE 1 de febrero de 2019)

**ESPECIALIDAD: MEDICINA FAMILIAR**

1	A	26	B	51	B	76	C
2	C	27	C	52	C	77	A
3	A	28	D	53	B	78	D
4	C	29	B	54	A	79	D
5	A	30	A	55	C	80	A
6	A	31	B	56	B	81	B
7	D	32	A	57	D	82	B
8	A	33	A	58	A	83	A
9	D	34	D	59	B	84	A
10	B	35	A	60	A	85	C
11	A	36	C	61	B	86	D
12	D	37	C	62	A	87	C
13	A	38	C	63	A	88	B
14	B	39	B	64	D	89	D
15	C	40	D	65	D	90	C
16	A	41	B	66	C	91	D
17	A	42	A	67	C	92	B
18	D	43	C	68	A	93	C
19	C	44	B	69	C	94	C
20	D	45	A	70	C	95	C
21	B	46	A	71	B	96	B
22	B	47	C	72	B	97	C
23	C	48	C	73	C	98	D
24	B	49	C	74	C	99	C
25	D	50	B	75	D	100	A

101	D	102	C	103	B
-----	---	-----	---	-----	---