

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD
PENITENCIARIA

(Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

CUARTO EJERCICIO (30-03-2022)



PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO
AL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(RESOLUCIÓN DE 6 DE OCTUBRE DE 2021,
DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
BOE DE 13 DE OCTUBRE DE 2021)

Especialidad de IDIOMA- ÁRABE
CUARTO EJERCICIO

توصيات مبدئية بشأن استخدام لقاح مودرنا mRNA-1273 المضاد لكوفيد-19

إرشادات مبدئية

الإصدار الأول: 25 كانون الثاني/يناير 2021

التحديث الأخير: 23 شباط/فبراير 2022

منظمة الصحة العالمية

الهدف العام والاستراتيجية العامة لاستخدام لقاح مودرنا mRNA-1273 المضاد لكوفيد-19

تسببت جائحة كوفيد-19 في معدلات اعتلال ووفيات كبيرة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن اضطرابات اجتماعية وتعليمية واقتصادية جسيمة. لذا نشأت حاجة ملحة على الصعيد العالمي إلى تطوير لقاحات فعالة ومأمونة وإتاحتها على نطاق واسع وبشكل منصف في جميع البلدان.

وبما أنه لن تتاح على الفور إمدادات كافية من اللقاحات لتمنيع جميع من يمكنهم الاستفادة منها، توصي منظمة الصحة العالمية بإعطاء أولوية استخدام اللقاحات في البداية للعاملين الصحيين وكبار السن المصابين أو غير المصابين بأمراض مصاحبة. ومع توفر المزيد من اللقاحات، ينبغي تطعيم مجموعات إضافية ذات أولوية في الاستخدام.

الإجراءات الاحترازية

يُعتبر وجود سوابق تدلّ على حساسية مفرطة لأي لقاح آخر أو علاج عن طريق الحقن بمثابة أحد المحاذير ولكنّه ليس مانعاً للتطعيم.

وينبغي أن يُجرى تقييم للمخاطر من قِبَل أخصائي صحي لهؤلاء الأشخاص. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هناك خطر متزايد من فرط الحساسية، ولكن يتعيّن إسداء المشورة بشأن المخاطر المحتملة للحساسية المفرطة، ويجب موازنة المخاطر مقابل فوائد التطعيم.

ويجب إخضاع هؤلاء الأشخاص للملاحظة لمدة 30 دقيقة بعد التطعيم في أماكن الرعاية الصحية حيث يمكن علاج فرط الحساسية على الفور.

وبشكل عام، يتعيّن ألا يتلقّى الأشخاص الذين يحدث لهم ردّ فعل تحسّسي فوري غير فرط الحساسية بعد الجرعة الأولى أيّ جرعات إضافية، ما لم يُنصَح بذلك بعد مراجعة من قِبَل أخصائي صحي يتمتّع بخبرة متخصصة.

البيئات الخاصة

يجب إعطاء الأولوية للأشخاص المتواجدين في أماكن مثل مخيمات اللاجئين ومعسكرات الاحتجاز والسجون والأحياء الفقيرة وغيرها من الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، حيث لا يمكن تنفيذ التباعد البدني، مع مراعاة البيانات الوبائية الوطنية والإمدادات باللقاحات والاعتبارات الأخرى ذات الصلة.

ينبغي إيلاء اعتبار خاص في البرامج الوطنية للفئات المتضرّرة بكوفيد-19 على نحو غير متناسب أو التي تواجه تفاوتات صحية نتيجة لأوجه الإجحاف الاجتماعي أو الهيكلي. ويتعيّن تحديد هذه المجموعات، والتغلّب على العوائق التي تواجه التطعيم، ووضع برامج لإتاحة الحصول على اللقاحات على قدم المساواة

دور اللقاحات ضمن تدابير وقائية أخرى

بما أنّ البيانات الأخيرة تشير إلى محدودية تأثير اللقاح على انتقال العدوى، لا سيما في سياق أوميكرون، يجب أن تستمرّ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية للحدّ من سريان فيروس كورونا-سارس-2، بما في ذلك استخدام كمامات الوجه، والتباعد البدني، وغسل اليدين، والتهوية الملائمة وغير ذلك من التدابير التي تقتضيها بيانات معيّنة، تبعاً لوبائيات كوفيد-19 والمخاطر المحتملة لظهور متحوّرات ناشئة.

وينبغي أن يستمرّ الأفراد الذين تمّ تطعيمهم، وكذلك أولئك الذين لم يتمّ تطعيمهم بعد، في اتّباع النصائح الحكوميّة بشأن تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعيّة.

وينبغي وضع استراتيجيات البلدان المتعلقة بمكافحة عدوى كوفيد-19 بحيث تُبيّن مشاركة الأطفال في الأنشطة التعليميّة وغير ذلك من جوانب الحياة الاجتماعيّة، بغضّ النظر عن التطعيم